LA PRISE EN CHARGE DE L'EMBOLIE PULMONAIRE À L'ETAT STABLE

Dr BEMBA Esthel Lee Presley

Praticien Hospitalo-Universitaire

Centre Hospitalier Universitaire de Brazzaville

FSSA, Université Marien NGOUABI

LIENS D'INTERET : AUCUN

INTRODUCTION

- ☞ MTEV : TVP + **Embolie Pulmonaire (EP)**
- ☞ Problème de santé publique : fréquence ++ / **Gravité +++ / Mortalité**
- ☞ **Urgence diagnostique / Thérapeutique**
- ☞ Diagnostic positif non aisé : Pas de signes spécifiques → **Scores de probabilité / Stratégies**
- ☞ Prise en charge codifiée (Recos / Guidelines+++)
- ☞ Thérapeutique : Anticoagulants Oraux Directs (AOD)
- ☞ Notre contexte : **Reco / Guidelines** → **Assurance Maladie (--)** ; **Plateau technique insuffisant**

DEFINITION

☞ Oblitération brutale (totale ou partielle) du tronc de l'artère pulmonaire ou d'une de ses branches par un corps étranger circulant, le plus souvent **fibrino-cruorique**.

Cohen Ariel. Cardiologie et pathologies cardiovasculaires. Paris: Estem; 1997.

AMPLEUR DU PROBLEME

📍 Incidence et Mortalité : Tendence mondiale 1997-2013

AMPLEUR DU PROBLEME

☛ Monde

- Incidence : 39 – 115 cas / 100.000 hbts
- **3^{ème} rang pathologies CAVA**
- Mortalité âge
- **Mortalité (03 mois) : 5-10%**

☛ France

- Incidence MTEV : 1,5 /1000 hbts EP (62%)
- **Mortalité : 5%**

Olié et al. Bull Epidemiol Hebd 2013

AMPLEUR DU PROBLEME

☛ Afrique sub-saharienne

- Données parcellaires / Sous-estimées
- Prévalence : 1,4% - 7%
- **Mortalité : 13%**

Igun et al. Niger Postgrad Med J. 2001

Diall et al. Mali Méd. 2011

Maniboliot et al. Pan Afr Med J. 2013

☛ Congo

- EP : **1,9% Urgences Cardiovasculaires !!!**

Ellenga Mbolla et al. Ann Science Santé. 2013

AMPLEUR DU PROBLEME

☞ Facteurs de risque : **Triade de Virchow**

- **Stase** : Kcer, Traumatisme, Chirurgie, Alitement...
- **Hypercoagulabilité** : Kcer, Pilule OP, Sepsis...
- **Paroi vasculaire** : Kcer ; Cathéter...

☞ Facteurs de risque : **Récidives**

- Facteurs majeurs : Transitoires / Permanents
- Facteurs mineurs : Transitoires / Permanents

Durée : Traitement

AMPLEUR DU PROBLEME

Facteurs de risque

Tableau 12 Définition des facteurs de risque cliniques de MVTE.

	Transitoire	Persistant
Majeur ^a	Chirurgie avec anesthésie générale > 30 minutes dans les 3 derniers mois Fracture des membres inférieurs dans les 3 derniers mois Immobilisation > 3 jours pour motif médical aigu dans les 3 derniers mois	Cancer actif
Mineur ^c	Contraception estroprogestative ^b , grossesse ^b , <i>post-partum</i> ^b , traitement hormonal de la ménopause ^b Chirurgie avec anesthésie générale < 30 minutes dans les 2 derniers mois Traumatisme d'un membre inférieur non plâtré avec mobilité réduite ≥ 3 jours Immobilisation < 3 jours pour motif médical aigu dans les 2 derniers mois Voyage > 6 heures	Maladies inflammatoires chroniques digestives ou articulaires : Crohn, recto-colite hémorragique

Une MVTE est non provoquée si elle survient en l'absence de facteur majeur transitoire et de facteur majeur persistant.

^a Ces facteurs de risque de récurrence sont définis comme majeurs car ils ont un impact majeur sur la décision de stopper ou de prolonger le traitement anticoagulant.

^b Ces facteurs sont définis comme mineurs transitoires dans la classification de Kearon et al. Toutefois, dans notre classification, ils sont classés comme majeurs transitoires car le risque de récurrence après arrêt de traitement est aussi faible (une fois le facteur absent) qu'après une chirurgie et que leur impact est donc majeur sur la décision de stopper le traitement anticoagulant.

^c Ces facteurs de risque de récurrence sont définis comme mineurs car ils ont un impact mineurs ou non démontré sur la décision de stopper ou de prolonger le traitement anticoagulant (il s'agit donc de facteurs de modulation).

STRATEGIE DIAGNOSTIQUE

STRATEGIE DIAGNOSTIQUE

☞ Présentation clinique polymorphe/
aspécifique

☞ Diagnostic impossible sur la clinique
seule

☞ **Devant la gravité d'EP : Clinique =**
Possibilité d'EP → Probabilité

Table 3 Clinical characteristics of patients with suspected PE in the emergency department (adapted from Pollack *et al.* (2011)).⁸²

Feature	PE confirmed (n = 1880)	PE not confirmed (n = 528)
Dyspnoea	50%	51%
Pleuritic chest pain	39%	28%
Cough	23%	23%
Substernal chest pain	15%	17%
Fever	10%	10%
Haemoptysis	8%	4%
Syncope	6%	6%
Unilateral leg pain	6%	5%
Signs of DVT (unilateral extremity swelling)	24%	18%

DVT = deep vein thrombosis.

STRATEGIE DIAGNOSTIQUE

☞ Probabilité $\Rightarrow$ Scores ++-

■ Score de Genève simplifié

- Faible : 0-1
- Intermédiaire : 2-4
- Forte > 4

■ Recommandé

- EP stable

Tableau 3 Score révisé de Genève.

	Version originale	Version simplifiée
Âge > 65 ans	+1	+1
Antécédent personnel de TVP ou EP	+3	+1
Immobilisation ou chirurgie sous AG < 4 semaines	+2	+1
Cancer actif (traitement en cours, palliatif ou rémission < 1 an)	+2	+1
Douleur de jambe unilatérale	+3	+1
Hémoptysie	+2	+1
Fréquence cardiaque entre 75 et 94/min	+3	+1
Fréquence cardiaque $\geq$ 95/min	+5	+2
Douleur à la palpation et œdème unilatéral de jambe	+4	+1

Version originale (3 catégories) : 0–3 : PC faible ; 4–10 : PC modérée ; $\geq$ 11 : PC élevée. Version originale (2 catégories) : 0–5 : EP improbable ; $\geq$ 6 : EP probable. Version simplifiée (3 catégories) : 0–1 : PC faible ; 2–4 : PC modérée ; $\geq$ 5 : PC élevée. Version simplifiée (2 catégories) : 0–2 : EP improbable ; $\geq$ 3 : EP probable.

STRATEGIE DIAGNOSTIQUE

➤ Probabilité $\Rightarrow$ Scores ++-

▪ Score de Wells simplifié

- Improbable : 0-1
- Probable > 1

Tableau 2 Score de Wells.

	Version originale	Version simplifiée
Signes et symptômes de TVP (gonflement et douleur)	+3,0	+1
Diagnostic différentiel moins probable que l'EP	+3,0	+1
Fréquence cardiaque $> 100/\text{min}$	+1,5	+1
Immobilisation ou chirurgie sous AG < 4 semaines	+1,5	+1
Antécédent personnel de TVP ou EP	+1,5	+1
Hémoptysie	+1,0	+1
Cancer actif (traitement en cours, < 6 mois ou palliatif)	+1,0	+1

Version originale (3 catégories) : < 2 : PC faible ; $2-6$: PC modérée ; > 6 : PC élevée. Version originale (2 catégories) : $0-4$: EP improbable ; ≥ 5 : EP probable. Version simplifiée (2 catégories) : $0-1$: EP improbable ; ≥ 2 : EP probable.

STRATEGIE DIAGNOSTIQUE

Suspicion clinique d'une EP

Faible/interm .probabilité clinique d'EP

Forte probabilité clinique d'EP

Biologie

D-Dimères

STRATEGIE DIAGNOSTIQUE

☛ D-Dimères

- Techniques : ELISA / ELFA (Se diagnostique > 95%)
- VPN +++++
- Seuils
 - > 500 µg/l avant 50 ans
 - > Age X 10 µg/l après 50 ans !!!

Reco ESC European Heart Journal 2019

STRATEGIE DIAGNOSTIQUE

Review

Age-Adjusted D-Dimer in the Prediction of Pulmonary Embolism: Systematic Review and Meta-analysis

Kenneth Iwuji¹, Hasan Almekdash¹, Kenneth M. Nugent¹, Ebtesam Islam¹, Briget Hyde¹, Jonathan Kopel¹, Adaugo Opiembe², and Duke Appiah¹

Journal of Primary Care & Community Health
Volume 12: 1–8
© The Author(s) 2021
Article reuse guidelines:
sagepub.com/journals-permissions
DOI: 10.1177/21501327211054996
journals.sagepub.com/home/jpc
SAGE

- Sensibilité élevée : 2 méthodes
- Méthode conventionnelle : **Faux positifs ++++ > 50 ans**

Table 1. Study Characteristics.

Studies [Number]	Suspected PE cases	AADD compared to conventional	age adjustment formula used (10 × age >50)	AADD sensitivity (%)	AADD specificity (%)	CDD sensitivity (%)	CDD specificity (%)	AADD true positive	AADD false positive	AADD true negative	AADD false negative	CDD true positive	CDD false positive	CDD true negative	CDD false negative
		(Y/N)	(Y/N)	(%)	(%)	(%)	(%)								
Deeks et al. ¹⁸ [1]	785	Y	Y	100	46	100	34	42	327	276	0	42	397	206	0
Senior et al. ⁹ [2]	6,655	Y	Y	90	75	97	64	222	1580	4829	24	239	2318	4091	7
Dutton et al. ¹⁰ [3]	329	Y	Y	96	32	100	7	67	176	84	2	69	242	18	0
Sheele et al. ¹² [4]	3117	Y	Y	89	25	96	7	51	867	287	6	55	1075	79	2
Sharp et al. ²² [5]	31,094	Y	Y	93	64	98	54	471	11039	19548	36	497	13937	6650	10
Flores et al. ²³ [6]	362	Y	Y	98	46	97	35	96	142	122	2	96	171	93	3
Friz et al. ²⁷ [7]	481	Y	Y	98	7	100	2	106	347	26	2	108	365	8	0
Parry et al. ²⁸ [8]	1834	Y	Y	100	60	98	55	98	700	1033	3	100	773	960	2
Gupta et al. ²⁴ [9]	3063	Y	Y	97	17	100	7	76	814	163	2	78	905	72	0

> Age X 10 µg/l après 50 ans

STRATEGIE DIAGNOSTIQUE

☛ D-Dimères non recommandés

- Probabilité clinique forte
- Hémodynamique instable
- Sous Anticoagulant à dose curative depuis plus de 24h

☛ D-Dimères élevées

D-dimères : situations qui augmentent le taux

cancer

grossesse

patients hospitalisés

infections

inflammation

Attention dans ces situations +++

STRATEGIE DIAGNOSTIQUE

Suspicion clinique d'une EP sans hypotension

Faible/interm. probabilité clinique d'EP

Forte probabilité clinique d'EP

D-Dimères

Négatif

Positif

Imagerie

AngioTDM

Dc EP exclu

STRATEGIE DIAGNOSTIQUE

☛ AngioTDM

- Sensibilité : **Emboles segmentaires/Supra (++++)** / **Emboles sous-segmentaires (+/-)**
- Probabilité clinique Faible / Intermédiaire : Exclure EP , Si angio TDM négatif
- **Probabilité clinique forte : Angio. TDM négatif ==>Poursuivre (Scintigraphie, Relecture...)**

Reco ESC European Heart Journal 2019

STRATEGIE DIAGNOSTIQUE

Suspicion clinique d'une EP sans choc ni hypotension

Faible/interm .probabilité clinique d'EP

Forte probabilité clinique d'EP

D-Dimères: Seuil

Positif

Négatif

AngioTDM : Supra/Segmentaire +++

Négatif

Positif

Négatif

Dc EP exclu

Dc EP confirmé

Autres investigations

STRATEGIE DIAGNOSTIQUE

EP confirmée, sans choc, ni hypotension

Risque de mortalité de L'EP

Scores

Faible

Intermédiaire faible

Intermédiaire fort

STRATEGIE DIAGNOSTIQUE

☛ Risque de mortalité ???

- Lieu de PEC : Ambulatoire ?, hosp. Conventionnelle ?; USIC ?; Réanimation?
- Modalités de TTT : anticoagulant / Reperfusion ???

☛ Scores

- Hestia
- Score de PESI
- Score de sPESI

STRATEGIE DIAGNOSTIQUE

Scores

Paramètre	PESI	sPESI
Sexe masculin	10	
Cancer	30	1
Insuffisance cardiaque <u>chronique</u>	10	1
Pathologie pulmonaire <u>chronique</u>	10	
Fréquence respiratoire > 30/min	20	
Age	1 / an	1 si >80
Saturation artérielle O ₂ < 90%	20	1
P artérielle systolique < 100mmHg	30	1
Fréquence cardiaque ≥ 110/min	20	1
Température <36°	20	
Trouble conscience/démence	60	

- Score pronostique: Évalue et classe la gravité EP
- Score de prise en charge: patients éligibles pour ambulatoire (PESI I-II, sPESI=0)

Risque faible

Risques intermédiaire/haut

Risque (mortalité 30 jours)

Classe I ≤ 65 : 0-1.6%	0 point: 0-2.1%
Classe II 66-85:1.7-3.5%	
Classe III 86-105: 3.2-7.1%	
Classe IV: 106-125: 4-11.4%	≥ 1 point 8.5-13.2
Classe V >125: 10.-24.5%	

STRATEGIE DIAGNOSTIQUE

EP confirmée sans choc/hypotension

Evaluation clinique du
risque sPESI

sPESI=0

sPESI > 0

Evaluation du
retentissement VD :
Echo, TDM Thorax
BNP, Troponine

Stratification du risque

Faible

Prise en charge

**Hospitalisation
courte : 24-48h**

STRATEGIE DIAGNOSTIQUE

☞ Echographie cardiaque

- VPN : **40-50%**
- Stratifie le risque de mortalité
- Dysfonction du VD ==> **Augmentation du risque de mortalité lors des EP stables**
 - **Critères Dysfonction du VD** : Dilatation du VD ; Augmentation VD/VG ...
- suspicion clinique +++ EP avec hémodynamique instable

Reco ESC European Heart Journal 2019

Coutance et al. Critical Care 2011

STRATEGIE DIAGNOSTIQUE

EP confirmée sans choc/hypotension

Evaluation clinique du
risque sPESI

sPESI=0

sPESI > 0

Evaluation du
retentissement VD :
Echo, TDM Thorax
BNP, Troponine

VD / Biomarqueurs: Si
1 seul+ ou les deux négatifs

VD / Biomarqueurs:
Les 2 positifs

Stratification du risque

Faible

Inter. faible

Inter. fort

Prise en charge

Hospitalisation
courte : 24-48h

Hospitalisation
conventionnelle

USI

STRATEGIE DIAGNOSTIQUE

☛ Les « oubliés » de la démarche diagnostique ???

- ECG : Tachycardie sinusale/ S1Q3/ Inversion des ondes T antérieures
- Radiographie thoracique : Atélectasie en bande/ Pleurésie
- Gaz du sang : Effet shunt

Peu sensibles / spécifiques → diagnostic positif d'EP

Ok → Diagnostic différentiel +++++

STRATEGIE THERAPEUTIQUE

Stratification du risque

Faible

Inter. faible

Lieu

**Hospitalisation courte :
24-48h**

Hospitalisation conventionnelle

TTT (aigue)

ANTICOAGULANTS

QUEL REGIME D'ANTICOAGULANT UTILISÉ ???

STRATEGIE THERAPEUTIQUE

☛ Anticoagulant oraux directs : **Apixaban** ; **Rivaroxaban**

- Action rapide ; Pas de surveillance de l'hémostase; Demi vie courte
- **C.I : Clairance créat < 15ml/min ; Grossesse; allaitement; SAPL...**
- **Schéma de prescription : AOD seuls, directement (*F.RENALE NORMALE*)**
 - Apixaban : 10mg x 2 / jour pdt 7 jrs puis 5mg x 2 / jr
 - Rivaroxaban : 15 mg x 2 / jour pdt 21 jrs puis 20mg/ jr
- **Notre contexte : Disponibilité / Coût !!! ; République du Congo (20-70 mille Fcfa)**

STRATEGIE THERAPEUTIQUE

☛ Anticoagulants parentérale (HBPM ; Fondaparinux) + AVK

- Surveillance de l'hémostase
- Schéma de prescription : INR > 2, pdt 2 jours consécutifs
- **Notre contexte ++++++**

☛ Anticoagulants parentérale (HNF) + AVK

- Surveillance de l'hémostase
- Clairance créatinine < 15 ml/ min

STRATEGIE THERAPEUTIQUE

Stratification du risque

Faible

Inter. faible

Lieu

Hospitalisation courte : 24-48h

Hospitalisation conventionnelle

Indications

**AOD en 1^{ère} intention
HBPM si Grossesse/allaitement/ Kcer
HNF si IR < 15ml/min**

Durée minimale = 3 mois

- **Pas de prolongation, Si MTEV II^{aire} FR Maj. Transitoire réversible**
- **Plutôt prolongé, Si 1^{er} EP/ non provoquée/ FR persistant**
- **Prolongation au long cours : MTEV récurrente sans FR réversible ; SAPL**

CONCLUSION

☞ **Prise en charge de l'EP stable**

- Basée sur des recommandations bien établies
- AOD = Alternative efficace et tolérée
- Action rapide, pas de surveillance de l'hémostase

☞ **Avantages des AOD dans l'EP stable**

- Simplification des protocoles / Bonne maniabilité et sécurité

☞ **Défis dans les contextes à ressources limitées**

- **Plateau technique / Coût de la para clinique**
- Disponibilité limitée des AOD//Coût élevé par rapport aux HBPM, AVK

MERCI